

**ДОРМИКИНД  
Таблетки**

8546 -2017

**Листок-вкладыш. Информация для пациентов.**

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

**Состав****Состав лекарственного средства**

В 1 таблетке (100 мг) содержится:

*активные вещества:* Cypripedium pubescens (Башмачок пушистый) D4 15 мг, Magnesium carbonicum (Магния карбонат) D10 20 мг, Zincum valerianicum (Цинкум Валерианик) D12 15 мг;  
*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

**Лекарственная форма**

Таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое лекарственное средство.

**Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется при беспокойстве и нарушениях сна у детей. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения. В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.


**Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Пожалуйста, информируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это касается также лекарственных средств, которые можно приобрести без рецепта.

**Меры предосторожности**

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Дормикинд таблетки содержат моногидрат лактозы. В связи с содержанием лактозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.



При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### *Применение у детей*

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

#### *Беременность и кормление грудью.*

Дормикинд таблетки не предназначены для применения взрослыми.

Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

#### *Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.*

При случайном приеме взрослым рекомендовано соблюдать осторожность при вождении автомобиля и работе с механизмами.

#### **Способ применения и дозировка**

Всегда применяйте ДОРМИКИНД так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт.

Если Вы не уверены в чем-либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети от 3 месяцев до 6 лет: по 1 таблетке до 4 раз в день. При уменьшении выраженности симптомов следует уменьшить частоту приема.

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Дети в возрасте до 3 месяцев: применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

Перед применением таблетки растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры (около 10 мл), принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

#### **Побочные действия**

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

*Примечание.* При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применяйте ДОРМИКИНД после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Хранение**

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка и ее содержимое**

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки. Белые или почти белые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской.

**Категория отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Фирма-производитель, адрес**

Дойче Хомеопати-Унион  
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ,  
Оттоштрассе 24  
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG  
Germany, Karlsruhe 76227  
Ottostrasse 24  
tel. +49 (721) 40 93 236

**Представитель в Республике Беларусь**

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь  
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б  
тел/факс (+375 17) 3350642.

**СОГЛАСОВАНО**  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь